


SIRDS-ASINSVADU SLIMĪBAS UN 2.TIPA CUKURA DIABĒTS

Sirds-asinsvadu slimības joprojām ir galvenais nāves iemesls cilvēkiem ar 2. tipa cukura diabētu¹



Cilvēki bez diabēta var nodzīvot vidēji **12 gadus ilgāk** nekā cilvēki ar diabētu un sirds-asinsvadu slimībām.²

50% 

Aptuveni **50%** cilvēku ar diabētu pasaulē mirst sirds un asinsvadu slimību dēļ.^{3,4}



Termins "Sirds-asinsvadu slimība" ietver visas sirds un asinsvadu saslimšanas, ieskaitot infarktu un insultu.

2x

Cilvēkiem ar diabētu ir līdz **2 reizēm** augstāks risks nomirt sirds-asinsvadu slimību dēļ.²

Atsauces

1. World Heart Federation. www.worldheartfederation.org/cardiovascularhealth/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/ (Skat. 2016. gada augustā). **2.** Emerging Risk Factors Collaboration. JAMA. 2015;314(1):5260. **3.** Nwaneri C, et al. Br J Diabetes Vasc Dis. 2013;13(4):192207. **4.** Morrish NJ, et al. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S1421.

LV/GEN/1117/00057

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle
Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, Latvija

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt: MedicalInformationService.RIG@Boehringer-Ingelheim.com